

Eretis djaelaelae, forme **punctigera**, n. forma. — C'est une forme chez laquelle le point hyalin de l'intervalle 3 des antérieures est plus fort.

Afrique Orientale anglaise (Muséum de Paris), 2 ♂, 1 ♀.

Eretis lugens Rogenh. ab. **rotundimacula**, n. ab. — Dans cette aberration, la tache hyaline de l'intervalle 3 des supérieures est ronde et assez grande, au lieu d'être linéaire comme chez le type.

Zanzibar, Afrique Orientale anglaise (Muséum de Paris), 1 ♂, 2 ♀.
— Angola (coll. BOULLET), 2 ♂.

Lépidoptères et Névroptères recueillis par le D^r Landrieu à l'île de Lesbos (Mytilène).

par J. DE JOANNIS.

M. le D^r É. RABAUD m'a remis les insectes suivants, recueillis en avril 1916 par M. le D^r LANDRIEU à l'île de Lesbos (région du sud-est, cap Malea-Loutra).

LÉPIDOPTÈRES

Nymphalidae-Satyrinae. — *Pararge megera* L. — *Epinephele jurtina* L. var. *hispulla* Hb. — *Coenonympha pamphilus* L. var. *lyllus* Esp.

Lycaenidae. — *Lycaena cyllarus* Rott.

Sphingidae. — *Macroglossa stellatarum* L.

Noctuidae. — *Acontia lucida* Hufn. forme très noire. — *Plusia gamma* L.

Geometridae. — * *Eucrostes beryllaria* Mn. — * *Problepsis ocellata* Friv. — * *Larentia permixtaria* H.-S. — *Bourmia* sp.? — *Aspilates ochrearia* Rossi.

Zygaenidae. — * *Zygaena brizae* Esp. var. *corycia* Stgr.

Cossidae. — *Dyspessa ulula* Bkh. (un peu douteux).

Les quatre espèces marquées d'un * donnent à cette petite collection un caractère franchement analogue à la faune d'Asie Mineure continentale.

*
* *

Outre ces Lépidoptères, M. le D^r LANDRIEU avait recueilli quelques Névroptères; ils ont été soumis au Rév. P. L. NAVÁS, à Saragosse, qui a bien voulu en dresser la liste suivante :

ODONATES

Libellulidae. — *Libellula depressa* L. — *Orthetrum brunneum* Fonse.

Aeschnidae. — *Brachytron hafniense* Müll.

Agrionidae. — *Platycnemis pennipes* Pall. ♂, ♀.

PLANIPENNES

Chrysopidae. — *Nothochrysa polemia*, n. sp. Ainsi nommé de πῶλεμος (guerre), en souvenir des circonstances et du lieu de sa capture, et aussi à cause des marques rouge sang qu'elle présente. La description complète avec figures sera publiée à Barcelone.

Nemopteridae. — *Nemoptera sinuata* Oliv. Espèce répandue dans la région continentale voisine.

Formes nouvelles de Chrysopides [NEVR.] et captures récentes

par J.-L. LACROIX.

Chrysopa vulgaris Schn. var. *radialis* Navás. — Après un examen attentif de mes Chrysopes du groupe *vulgaris*, je pense que ma variété *praetexta* est bien la var. *radialis* du Rév. P. NAVÁS. Dans ma variété, le bord marginal du prothorax est souvent très taché et les marques du dessus de l'abdomen sont plutôt nulles; *praetexta* tombe donc en synonymie.

La var. *radialis* est très commune et répandue dans l'Ouest de la France.

Chrysopa vulgaris Schn. var. *vicina* Lacr. — J'ai publié cette forme dans le *Bull. Soc. ent. de France* [1915], p. 229. — Je disais, à la suite de la description, qu'elle pourrait peut-être constituer, avec *nigropilosa*, *nemorosa*, *lateralis*, *stigmalis*, *namursensis* et *bilineata* du Rév. P. NAVÁS, une seule et même variété, à des degrés divers de pigmentation. Une attentive revision de mes Chrysopides me fait voir que cette interprétation est erronée. *Vicina* constitue bien une forme




Fig. 1 (1).

(1) *Chrysopa vulgaris* Schn. var. *vicina* Lacr. — Abdomen vu de côté.